

PANACEO MED Therapy Pro

Zdravotnický prostředek obsahující látky přírodního původu, třída IIb CE 0477

Čisté množství náplně: 100 g (200 kapslí)

Čisté množství náplně: 200 g prášku

Složky obsažené v kapsli:

PMA-zeolit 410 mg

Kapsle: Celulóza.

Složky obsažené ve 100 g prášku:

PMA-zeolit 100 g.

Deklarovaná hmotnost vychází z přirozené variace

Doporučené podávání:

Užívejte 3 kapsle 2-3x denně s jídlem a sklenicí vody (alespoň 100 ml).

Doporučené podávání:

Užívejte jednu zarovnanou lžici prášku smíchanou se sklenicí vody (alespoň 100 ml) 2-3x denně s jídlem.

Doba užívání by měla být alespoň 12 týdnů nebo tak dlouho, dokud trvá opakující se stres.

V Rakousku vyrábí:

Panaceo International GmbH

Finkensteiner Str. 5 A-9585

Gödersdorf, Villach, Rakousko

Číslo verze štítku

Zvyšuje toleranci léčebných postupů

Zvyšuje toleranci léčebných postupů posílením bariéry střevní stěny. Opravou poškozené střevní sliznice (zvýšená střevní permeabilita) napomáhá MED THERAPY-PRO ke zlepšení celkového stavu a zánětu, krevních a jaterních hodnot.

Panaceo MED THERAPY-PRO je zdravotnický prostředek obsahující látky přírodního původu, který v zažívacím traktu funguje jako kationtový měnič a dokáže selektivně vázat a odstraňovat definované škodlivé látky.

Aktivní složkou v Panaceo MED THERAPY-PRO je optimalizovaný PMA-zeolit™. Technologie PMA (Panaceo Micro Activation) je patentovaná a jedinečnost i příslibený účinek PMA-zeolitu™ byly vědecky prokázány.

Je známo, že různé druhy stresu, zejména lékový a fyzický, mohou vést k narušení bariéry střevní stěny (zvýšená střevní permeabilita). V důsledku zvýšené permeability se do krevního oběhu dostává více škodlivých látek a endotoxinů ze střeva.

Se zvýšenou střevní permeabilitou mohou souviset příznaky, jako je např. zhoršení zánětu a jaterních hodnot, nespecifická únava nebo špatný celkový stav. Doporučujeme příznaky probrat s lékařem, kterému důvěřujete.

Užívání je doporučeno dospělým od 18 let.

Bezpečnostní informace:

Neexistují žádné vedlejší účinky vyjma občasné zácpy. To je zvláště důležité v případě chronické zácpy.

Pokud zaznamenáte neočekávaný účinek, přestaňte užívat.

Aby se předešlo nežádoucím lékovým interakcím, doporučujeme užívat Panaceo MED a medikaci s 2 hodinovým časovým odstupem, přičemž léky by měly být užívány před zeolitem, pokud není předepsáno jinak.

V případě, že současně užíváte léky, informujte svého lékaře, protože vedlejším účinkem Panaceo může být zvýšení vlastní imunitní aktivity.

Použití nelze doporučit dětem a dospívajícím (do 18 let), těhotným a kojícím ženám, protože zatím nejsou k dispozici dostatečné údaje.

Bez porady s lékařem nepřekračujte uvedenou doporučenou dávku. Nevdechujte prášek. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 6 let. Po použití pevně uzavřete víčko.

Neustálá kontrola kvality zajišťuje vysokou kvalitu a účinnost jako schváleného zdravotnického prostředku v souladu se směrnicí EHS 93/42/EHS.

Další informace

PRO SVÉ CHARAKTERISTIKY MŮŽE NAPOMÁHAT ELIMINACI RADIOAKTIVNÍCH
ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK www.allremedy.eu